

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MANEJO DE LAS PLAGAS DE CONTROL OFICIAL EN EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE

Resolución ICA 092771 de 2021

ANILLO ROJO



MONITOREO: mensual.



MEDIDAS PREVENTIVAS: manejo de *Rhynchophorus palmarum*.

MEDIDAS DE MANEJO:

eliminar **palmas enfermas** 3 días después de **diagnosticarlas** utilizando **métodos autorizados** por el ICA.



MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: destruir los **residuos** por medio de **picado**.



MARCHITEZ SORPRESIVA



MONITOREO:

- En áreas libres: mensual.
- En áreas afectadas: semanal.



MEDIDAS PREVENTIVAS: apicar las **mejores prácticas** agronómicas.

MEDIDAS DE MANEJO:

eliminar **palmas enfermas** máximo 3 días después de **diagnosticarlas** utilizando **métodos autorizados** por el ICA



MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: aplicar **insecticida** a la cobertura vegetal y a las palmas en un radio de **18 a 27 metros** para el control de **vectores**.



PUDRICIÓN DEL COGOLLO



MONITOREO: mensual.
Ante incremento de la enfermedad: según el **criterio del asistente técnico**.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Selección adecuada de **material de siembra**.
- Construcción y mantenimiento de la **red de drenaje**.
- Nutrición óptima.
- Aplicaciones **profilácticas** según **indicación** del asistente técnico.



MEDIDAS DE MANEJO:

- Determinar el **grado de severidad** de la enfermedad según la escala de severidad de **Genipalma**.
- Hacer remoción de **tejidos enfermos** y aplicar insecticida al cogollo para control de **R. palmarum**.
- Eliminar con **método mecánico**



las palmas que se mantengan en **grados de severidad avanzados** y sin evidencias de recuperación.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:

- Carbonizar los tejidos afectados de **manera controlada**.
- Picar y esparcir los **residuos**.



MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MANEJO DE LAS PLAGAS DE CONTROL OFICIAL EN EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE

Resolución ICA 092771 de 2021



MARCHITEZ LETAL



MONITOREO:

- En áreas libres: mensual
- En áreas afectadas: semanal

MEDIDAS PREVENTIVAS: aplicar las mejores prácticas agronómicas.



MEDIDAS DE MANEJO: eliminar palmas enfermas máximo 3 días después de diagnosticarlas con métodos autorizados por el ICA.



MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:

aplicar insecticida a la cobertura vegetal y a las palmas en un radio de 27 a 36 metros para el control de vectores.



STRATEGUS ALOEUS



MONITOREO: cada 8 días en plantaciones menores de 2 años.



MEDIDAS PREVENTIVAS: antes de la renovación, garantizar que no existan residuos de estípites sin descomponerse.

MEDIDAS DE MANEJO: detectar montículos o galerías en el suelo y aplicar insecticidas para el control de adultos.



RHYNCHOPHORUS PALMARUM



MONITOREO: establecer una red de trapeo perimetral con trampas distanciadas 100 metros entre sí.



TRAMPA: recipiente plástico de 20 litros, dos ventanas de 12 x 8 cm en los lados anchos del recipiente a 5 cm de la parte superior. Recubrimiento de costal de polipropileno desde la base hasta la altura de las ventanas. En el interior, cebo vegetal atrayente y feromona activa para *R. palmarum*.

MEDIDAS PREVENTIVAS: aplicar medidas de control de la PC, mantener podas y cosecha al día.



MEDIDAS DE MANEJO: fortalecer la red de trapeo ante incremento de poblaciones.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: destruir los residuos de palmas eliminadas por medio de picado y esparcido para evitar la reproducción de *R. palmarum*.



Escanee este código QR con su celular y descargue la resolución ICA 092771 de 2021

